

1	<p>Herr M., 68 Jahre alt, wurde vor 12 Stunden laparoskopisch cholezystektomiert. Seit dem Aufwachen klagt er über zunehmende Atemnot und Schmerzen im rechten Thoraxbereich. Die Sauerstoffsättigung liegt bei 89%. Welche Komplikation muss vorrangig ausgeschlossen werden?</p> <p>a) Lungenembolie b) Pneumonie c) Pleuraerguss d) Ileus</p>	1	<p>Secondo le linee guida SNLG, quando deve essere somministrata la profilassi antibiotica pre-operatoria?</p> <p>a) Dopo l'incisione chirurgica b) Durante la sutura della ferita c) Entro 60 minuti prima dell'incisione d) Solo in caso di febbre pre-operatoria</p>
2	<p>Ein septischer Patient hatte ein Risiko, folgendes Schockgeschehen zu entwickeln:</p> <p>a) einen hypovolämischen Schock b) einen distributiven Schock c) einen kardiogenen Schock d) einen obstruktiven Schock</p>	2	<p>Qual è il primo intervento in caso di comportamento aggressivo in reparto acuto di psichiatria?</p> <p>a) Immobilizzazione immediata b) Somministrazione di sedativi senza consulto medico c) Comunicazione de-escalante e mantenimento della distanza d) Ignorare per evitare di dare attenzione</p>
3	<p>Welcher Übertragungsweg spielt die wichtigste Rolle bei der Ansteckung mit offener Tuberkulose?</p> <p>a) Schmierinfektion über kontaminierte Flächen b) Tröpfcheninfektion beim Einatmen von erregerhaltigen Aerosolen c) Übertragung durch kontaminiertes Trinkwasser d) Ansteckung beim Geschlechtsverkehr</p>	3	<p>Una complicazione comune della gravidanza caratterizzata da pressione alta e proteine nelle urine è:</p> <p>a) il diabete gestazionale b) la eclamsia c) l'iperemesi gravidica d) la preeclamsia</p>
4	<p>Das Sprechventil bei einem Patienten mit Tracheostomakanüle:</p> <p>a) kann nur bei fenestrierten Kanülen verwendet werden b) kann bei allen Kanülentypen verwendet werden c) kann nur bei Kanülen ohne Cuff verwendet werden d) kann nur bei Kanülen mit Cuff verwendet werden</p>	4	<p>Durante una rianimazione cardiopolmonare:</p> <p>a) una ETCO₂ inferiore a 10 mmHg è un chiaro segno di embolia polmonare b) una ETCO₂ inferiore a 10 mmHg indica un ritorno della circolazione spontanea (ROSC) c) una ETCO₂ inferiore a 10 mmHg ci deve indurre ad ottimizzare le manovre rianimatorie d) una ETCO₂ superiore a 10 mmHg è un chiaro segno di embolia polmonare</p>
5	<p>Welche Aussage zum ABO-Blutgruppensystem ist korrekt?</p> <p>a) Personen mit Blutgruppe 0 besitzen sowohl Anti-A- als auch Anti-B-Antikörper im Blutplasma und können daher nur Erythrozyten der eigenen Blutgruppe empfangen b) Blutgruppe AB ist aufgrund fehlender Antikörper im Plasma die Universalspendergruppe für Erythrozyten c) Menschen mit Blutgruppe A haben Antikörper gegen Antigen A im Plasma d) Personen mit Blutgruppe B besitzen Antigene A und B auf der Erythrozytenoberfläche</p>	5	<p>La signora L., 54 anni, è stata operata per un carcinoma mammario. Ha un drenaggio Redon in situ che ha raccolto 180 ml di liquido ematico in 6 ore. Come deve comportarsi l'infermiere/a in questa situazione?</p> <p>a) Rimuovere immediatamente il drenaggio b) Informare il medico per l'elevata quantità di secrezione c) Clampare il drenaggio d) Mobilizzare la paziente per favorire il drenaggio</p>

Fragebogen B – Questionario B

6	<p>Welche Aussage beschreibt den Diabetes mellitus Typ 2 und seine möglichen Spätkomplikationen korrekt?</p> <p>a) Diabetes Typ 2 ist durch einen vollständigen Insulinmangel gekennzeichnet und führt selten zu Organschäden</p> <p>b) Diabetes Typ 2 beruht auf Insulinresistenz und beeinträchtigter Insulinsekretion; typische Spätkomplikationen sind diabetische Nierenerkrankungen und Netzhauterkrankungen</p> <p>c) Diabetes Typ 2 tritt überwiegend im Kindesalter auf und verschwindet oft ohne Behandlung Diabetes Typ 2 tritt überwiegend im Kindesalter auf und verschwindet oft ohne Behandlung</p> <p>d) Diabetes Typ 2 verursacht keine Nervenschäden und erhöht nicht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen</p>	6	<p>La "triade di Virchow" descrive tre fattori chiave che contribuiscono alla formazione di un trombo. Questi fattori sono:</p> <p>a) ipovolemia, danno alla parete del vaso e ipercolesterolemia</p> <p>b) rallentamento del flusso sanguigno, scarsa o nessuna attività fisica e ipercoagulabilità del sangue</p> <p>c) embolie polmonari congenite, danno alla parete del vaso e ipertensione arteriosa</p> <p>d) rallentamento del flusso sanguigno, danno alla parete del vaso e ipercoagulabilità del sangue</p>
7	<p>Welche Empfehlung gilt laut Leitlinien für das postoperative Schmerzmanagement?</p> <p>a) Schmerzmittel nur auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten geben</p> <p>b) Verwendung validierter Schmerzskalen und standardisierter Protokolle</p> <p>c) Opiode grundsätzlich vermeiden</p> <p>d) Keine Schmerzdokumentation bei sedierten Patienten</p>	7	<p>Un paziente settico è a rischio di sviluppare:</p> <p>a) uno shock ipovolemico</p> <p>b) uno shock distributivo</p> <p>c) uno shock cardiogeno</p> <p>d) uno shock ostruttivo</p>
8	<p>Wie hoch ist die theoretische Erfolgswahrscheinlichkeit der Defibrillation nach 5 Minuten bei Herzstillstand ohne Herz-Lungen-Wiederbelebung?</p> <p>a) etwa 10%</p> <p>b) 20% - 30%</p> <p>c) etwa 50%</p> <p>d) etwa 70%</p>	8	<p>In caso di ostruzione da corpo estraneo delle vie aeree superiori all'emogasanalisi si rileva?</p> <p>a) ipossiemia e ipercapnia</p> <p>b) ipossiemia e ipocapnia</p> <p>c) ipercapnia e iperossia</p> <p>d) ipocapnia</p>
9	<p>Die pflegerische Triage in der Notaufnahme:</p> <p>a) ist ein System, das den Durchlauf der Patient*innen in der Notaufnahme beschleunigt</p> <p>b) ist ein System zur Reduzierung der Zugänge zur Notaufnahme</p> <p>c) ist ein Instrument des klinischen Risikomanagements</p> <p>d) ist ein System zur Entscheidung, wer eine Zuzahlung leisten muss</p>	9	<p>Quale affermazione sul sistema del gruppo sanguigno ABO è corretta:</p> <p>a) Nelle persone con gruppo sanguigno 0 sono presenti nel plasma sia anticorpi anti-A che anti-B e possono quindi ricevere solo eritrociti del proprio gruppo sanguigno</p> <p>b) Il gruppo sanguigno AB è il gruppo donatore universale di eritrociti a causa della mancanza di anticorpi nel plasma</p> <p>c) Le persone con gruppo sanguigno A hanno anticorpi contro l'antigene A nel plasma</p> <p>d) Sulla superficie degli eritrociti delle persone con gruppo sanguigno B sono presenti gli antigeni A e B</p>
10	<p>Bei einem Patienten mit frischer Anastomose nach Kolonresektion treten Fieber, Leukozytose und Abwehrspannung auf. Was ist die wahrscheinlichste Komplikation?</p> <p>a) Ileus</p> <p>b) Anastomoseninsuffizienz</p> <p>c) Pneumonie</p> <p>d) Harnwegsinfektion</p>	10	<p>Cosa rappresenta l'onda T nell'elettrocardiogramma (ECG)?</p> <p>a) La depolarizzazione degli atri</p> <p>b) La ripolarizzazione dei ventricoli</p> <p>c) La depolarizzazione dei ventricoli</p> <p>d) La ripolarizzazione degli atri</p>

Fragebogen B – Questionario B

11	<p>Welche der folgenden Aussagen entspricht einem Grundsatz des deontologischen Kodex der Krankenpfleger in Italien?</p> <p>a) Der Patient muss Anweisungen befolgen, auch ohne deren Bedeutung zu verstehen</p> <p>b) Die Pflegeperson darf persönliche Überzeugungen über die Bedürfnisse des Patienten stellen</p> <p>c) Die Autonomie und Würde des Patienten sind stets zu achten</p> <p>d) Der deontologische Kodex erlaubt es, vertrauliche Informationen ohne Zustimmung weiterzugeben</p>	<p>11 Qual è la principale via di trasmissione della tubercolosi aperta?</p> <p>a) Contatto con superfici contaminate</p> <p>b) Inalazione di aerosol infetti emessi con la tosse</p> <p>c) Acqua potabile contaminata</p> <p>d) Contagio tramite rapporti sessuali</p>
12	<p>Welcher Grundsatz zur interprofessionellen Zusammenarbeit wird im deontologischen Kodex der Krankenpfleger in Italien betont?</p> <p>a) Die Pflegeperson agiert unabhängig von anderen Berufsgruppen, um die eigene berufliche Autonomie zu wahren</p> <p>b) Die interprofessionelle Zusammenarbeit dient primär der Einhaltung administrativer Abläufe im Gesundheitssystem</p> <p>c) Pflegepersonen tragen Mitverantwortung für eine integrierte Versorgung und respektieren anderer Berufsgruppen</p> <p>d) Die Koordination ist nur in komplexen klinischen Situationen erforderlich</p>	<p>12 Quale affermazione descrive correttamente il diabete mellito di tipo 2 e le sue possibili complicanze tardive?</p> <p>a) Il diabete di tipo 2 è caratterizzato da una completa mancanza di insulina e raramente causa danni agli organi</p> <p>b) Il diabete di tipo 2 è causato da insulino-resistenza e ridotta secrezione di insulina; tra le complicanze tardive si includono la nefropatia diabetica e la retinopatia</p> <p>c) Il diabete di tipo 2 si manifesta principalmente nell'infanzia e spesso scompare senza trattamento</p> <p>d) Il diabete di tipo 2 non comporta danni ai nervi né aumenta il rischio cardiovascolare</p>
13	<p>Was ist bei der Kontrolle eines Wunddrainagesystems besonders wichtig?</p> <p>a) Tägliche Entfernung ohne Kontrolle</p> <p>b) Menge, Farbe und Beschaffenheit der Drainageflüssigkeit beobachten</p> <p>c) Die Wunde jeden Tag selbstständig spülen</p> <p>d) Drainage immer auf Bauchhöhe halten</p>	<p>13 Come si può riconoscere un esordio psicotico?</p> <p>a) Maggiore capacità di concentrazione</p> <p>b) Sfiducia, isolamento e alterazioni della percezione</p> <p>c) Aumento del bisogno di dormire</p> <p>d) Eccessiva attenzione all'igiene</p>
14	<p>Die Glasgow Coma Scale (GCS) ist eine neurologische Skala zur Beurteilung des Bewusstseinszustandes eines Patienten. Sie umfasst die Bewertung von drei Funktionen:</p> <p>a) Schmerzlokalisierung, Befolgung von Aufforderungen, Augenöffnung</p> <p>b) Augenreaktion, motorische Reaktion, Atemrhythmus</p> <p>c) Hirnstammreflexe, verbale Reaktion, Schmerzlokalisierung</p> <p>d) Augenöffnung, verbale Reaktion, motorische Reaktion</p>	<p>14 Il signor M., 68 anni, è stato sottoposto a colecistectomia laparoscopica 12 ore fa. Da quando si è svegliato, lamenta dispnea crescente e dolore toracico destro. La saturazione dell'ossigeno è 89%. Quale complicanza deve essere esclusa?</p> <p>a) Embolia polmonare</p> <p>b) Polmonite</p> <p>c) Versamento pleurico</p> <p>d) Ileo</p>
15	<p>Die "Cushing-Trias" oder der Cushing-Reflex, ist eine Kombination aus drei physiologischen Reaktionen, die als Antwort auf einen erhöhten intrakraniellen Druck auftreten. Diese Reaktionen sind:</p> <p>a) Hypertonie, Bradykardie und Atemveränderungen</p> <p>b) Hypotonie, Bradykardie und Atemveränderungen</p> <p>c) Hypotonie, Tachykardie und Atemveränderungen</p> <p>d) Pupillenerweiterung, Bewusstseinsveränderung und Atemveränderungen</p>	<p>15 Che impatto ha il rispetto dell'igiene delle mani sulle infezioni nosocomiali secondo l'OMS?</p> <p>a) Basso, poiché la maggior parte degli agenti patogeni si trasmette per via aerea</p> <p>b) Previene solo le infezioni batteriche</p> <p>c) È considerata la misura singola più efficace per prevenire le infezioni</p> <p>d) È importante solo nelle sale operatorie</p>

Fragebogen B – Questionario B

16	<p>Laut den SNLG-Leitlinien: Wann sollte die antibiotische Prophylaxe vor einem chirurgischen Eingriff verabreicht werden?</p> <p>a) Nach dem Hautschnitt b) Während des Wundverschlusses c) Innerhalb von 60 Minuten vor dem Hautschnitt d) Nur bei präoperativem Fieber</p>	16	<p>Come si riconosce un'ipovolemia post-operatoria?</p> <p>a) Pressione bassa, tachicardia, pelle pallida b) Febbre e sudorazione c) Ipertensione e agitazione d) Aumento di peso</p>
17	<p>Woran kann man einen beginnenden psychotischen Schub erkennen?</p> <p>a) Gesteigerte Konzentration b) Misstrauen, Rückzug, Wahrnehmungsveränderungen c) Vermehrtes Schlafbedürfnis d) Übertriebene Hygiene</p>	17	<p>La valvola fonatoria, in un paziente portatore di cannula tracheostomica:</p> <p>a) può essere applicata solo alle cannule fenestrate b) può essere applicata a tutti i tipi di cannule c) può essere applicata solo alle cannule non cuffiate d) può essere applicata solo alle cannule cuffiate</p>
18	<p>In welcher der folgenden Situationen ist eine hygienische Händedesinfektion gemäß den „5 Momenten der Händehygiene“ der WHO erforderlich?</p> <p>a) Vor dem Betreten des Pausenraums auf der Station b) Nach dem Ausziehen der Dienstkleidung c) Vor dem Anlegen der persönlichen Schutzausrüstung im Lagerraum d) Vor einer aseptischen Tätigkeit</p>	18	<p>Il triage infermieristico in pronto soccorso:</p> <p>a) è un sistema che velocizza il passaggio dei pazienti attraverso il pronto soccorso b) è un sistema utile a diminuire gli accessi al pronto soccorso c) è un sistema di gestione del rischio clinico d) è un sistema utile per decidere chi deve pagare il ticket</p>
19	<p>Herr A., 64 Jahre, nach Sigmaresektion klagt am 2. postoperativen Tag über Übelkeit, aufgeblähten Bauch und fehlenden Stuhlgang. Die Auskultation ergibt laute, metallisch klingende Darmgeräusche. Welche Komplikation ist am wahrscheinlichsten?</p> <p>a) Anastomoseninsuffizienz b) Postoperativer Ileus c) Harnverhalt d) Pneumonie</p>	19	<p>Durante una trasfusione, un paziente sviluppa improvvisamente febbre, brividi e difficoltà respiratorie. Qual è la risposta corretta?</p> <p>a) Interrompere immediatamente la trasfusione, mantenere l'accesso venoso, chiamare il medico e controllare i segni vitali b) Continuare la trasfusione e rassicurare il paziente fino all'arrivo del medico c) Aumentare la velocità di infusione per superare più rapidamente i sintomi d) Somministrare al paziente un antidolorifico e interrompere la trasfusione solo dopo aver consultato il medico</p>
20	<p>Wie erkennt man eine postoperative Hypovolämie?</p> <p>a) Niedriger Blutdruck, Tachykardie, blasse Haut b) Fieber und Schwitzen c) Hypertonie und Unruhe d) Gewichtszunahme</p>	20	<p>Un paziente sottoposto a resezione del colon presenta febbre, leucocitosi e addome dolente. Qual è la complicanza più probabile?</p> <p>a) Occlusione intestinale b) Deiscenza dell'anastomosi c) Polmonite d) Infezione urinaria</p>
21	<p>Die "Virchow-Trias" beschreibt drei Schlüsselfaktoren, die zur Thrombosebildung beitragen. Diese Faktoren sind:</p> <p>a) Hypovolämie, Gefäßwandschädigung und Hypercholesterinämie b) Verlangsamung des Blutflusses, geringe oder fehlende körperliche Aktivität und Hyperkoagulabilität des Blutes c) Angeborene Lungenembolien, Gefäßwandschädigung und arterielle Hypertonie d) Verlangsamung des Blutflusses, Gefäßwandschädigung und Hyperkoagulabilität des Blutes</p>	21	<p>La Glasgow Coma Scale (GCS) è una scala neurologica utilizzata per valutazione dello stato di coscienza di un paziente. Questa scala prevede la valutazione di tre funzioni:</p> <p>a) localizza il dolore, obbedisce ai comandi, apertura degli occhi b) risposta oculare, risposta motoria, ritmo respiratorio c) riflesso tronco cerebrale, risposta verbale, localizza il dolore d) apertura degli occhi, risposta verbale, risposta motoria</p>

Fragebogen B – Questionario B

22	<p>Während einer kardiopulmonalen Reanimation:</p> <p>a) Ist ein ETCO₂-Wert unter 10mmHg ein eindeutiges Zeichen für eine Lungenembolie</p> <p>b) weist ein ETCO₂- Wert unter 10mmHg auf eine Rückkehr des Spontankeislaufs (ROSC) hin</p> <p>c) sollte uns ein ETCO₂- Wert unter 10mmHG dazu veranlassen, die Reanimationsmaßnahmen zu optimieren</p> <p>d) ist ein ETCO₂- Wert über 10 mmHg ein eindeutiges Zeichen für eine Lungenembolie</p>	22	<p>Quale raccomandazione è prevista per la gestione del dolore post-operatorio secondo le linee guida?</p> <p>a) Somministrare analgesici solo su richiesta del paziente</p> <p>b) Utilizzare protocolli di valutazione e trattamento del dolore validati</p> <p>c) Evitare oppioidi in ogni caso</p> <p>d) Non documentare la scala del dolore se il paziente è sedato</p>
23	<p>Eine häufige Schwangerschaftskomplikation, die durch Bluthochdruck und Eiweiß im Urin gekennzeichnet ist:</p> <p>a) Schwangerschaftsdiabetes</p> <p>b) Eklampsie</p> <p>c) Hyperemesis gravidarum</p> <p>d) Präeklampsie</p>	23	<p>Un paziente si presenta con dispnea, tachipnea e rantoli umidi bilaterali. Viene diagnosticata un'insufficienza cardiaca sinistra. Qual è la complicanza più tipica che si manifesta inizialmente in questo quadro clinico?</p> <p>a) Edema polmonare</p> <p>b) Edemi delle gambe</p> <p>c) Congestione della vena giugulare</p> <p>d) Ridotta perfusione renale</p>
24	<p>Was wird durch die T-Welle im Elektrokardiogramm (EKG) dargestellt?</p> <p>a) Die Depolarisation der Vorhöfe</p> <p>b) Die Repolarisation der Ventrikel</p> <p>c) Die Depolarisation der Ventrikel</p> <p>d) Die Repolarisation der Vorhöfe</p>	24	<p>Cosa è particolarmente importante nel controllo di un sistema di drenaggio della ferita?</p> <p>a) Rimuoverlo ogni giorno senza controllo</p> <p>b) Osservare quantità, colore e consistenza del liquido drenato</p> <p>c) Lavare la ferita autonomamente ogni giorno</p> <p>d) Tenere il drenaggio sempre all'altezza dell'addome</p>
25	<p>Welche Maßnahme ist bei aggressivem Verhalten eines Patienten im Akutbereich der Psychiatrie durchzuführen?</p> <p>a) Sofortige Fixierung</p> <p>b) Medikamentöse Sedierung ohne Rücksprache mit dem Arzt</p> <p>c) Deeskalierende Kommunikation und Abstand wahren</p> <p>d) Ignorieren, um keine Aufmerksamkeit zu geben</p>	25	<p>La "triade di Cushing", o riflesso di Cushing, è un insieme di tre reazioni fisiologiche che si verificano in risposta all'aumento della pressione intracranica. Queste reazioni sono:</p> <p>a) ipertensione, bradicardia e alterazioni del respiro</p> <p>b) ipotensione, bradicardia e alterazioni del respiro</p> <p>c) ipotensione, tachicardia e alterazioni del respiro</p> <p>d) dilatazione delle pupille, alterazione stato di coscienza e alterazioni del respiro</p>
26	<p>Ein Patient entwickelt während einer Bluttransfusion plötzlich Fieber, Schüttelfrost und Atemnot. Welche Maßnahme ist jetzt korrekt?</p> <p>a) Die Transfusion sofort stoppen, den venösen Zugang belassen, den Arzt informieren und die Vitalzeichen kontrollieren</p> <p>b) Die Transfusion fortsetzen und den Patienten beruhigen, bis der Arzt eintrifft.</p> <p>c) Die Infusionsgeschwindigkeit erhöhen, um die Symptome schneller zu überwinden</p> <p>d) Dem Patienten ein Schmerzmittel verabreichen und die Transfusion erst nach Rücksprache mit dem Arzt stoppen</p>	26	<p>Quale delle seguenti affermazioni riflette un principio del Codice Deontologico degli Infermieri in Italia?</p> <p>a) Il paziente deve seguire le indicazioni anche senza comprenderle</p> <p>b) Le convinzioni personali possono prevalere sui bisogni del paziente</p> <p>c) L'autonomia e la dignità del paziente vanno sempre rispettate</p> <p>d) Il codice deontologico consente la divulgazione di informazioni riservate senza consenso</p>

Fragebogen B – Questionario B

27	<p>Ein Patient zeigt bei der Aufnahme Dyspnoe, eine erhöhte Atemfrequenz und feuchte Rasselgeräusche über beiden Lungen. Eine Linksherzinsuffizienz wird diagnostiziert. Welche Komplikation tritt typischerweise infolge der Linksherzinsuffizienz zuerst auf?</p> <p>a) Lungenödem b) Beinödem c) Stauung der Vena jugularis d) Verminderte Nierendurchblutung</p>	27	<p>Il signor A., 64 anni, operato di resezione del sigma lamenta, al secondo giorno post-operatorio, nausea, addome disteso e assenza di evacuazione. All'auscultazione si sentono rumori intestinali metallici. Qual è la complicanza più probabile?</p> <p>a) Deiscenza dell'anastomosi b) Ileo post-operatorio c) Ritenzione urinaria d) Polmonite</p>
28	<p>Welchen Einfluss hat die konsequente Einhaltung der Händehygiene auf nosokomiale Infektionen laut WHO?</p> <p>a) Gering, da die meisten Erreger über die Luft übertragen werden b) Sie verhindert nur bakterielle Infektionen c) Sie gilt als wirksamste Einzelmaßnahme zur Infektionsprävention d) Sie ist nur im OP- Bereich von Bedeutung</p>	28	<p>In quale delle seguenti situazioni è richiesta la disinfezione igienica delle mani secondo i "5 momenti dell'igiene delle mani" dell'OMS?</p> <p>a) Prima di entrare nella cucinetta del reparto b) Dopo aver tolto gli abiti da lavoro c) Prima di indossare i dispositivi di protezione individuale nel magazzino d) Prima di un'attività asettica</p>
29	<p>Im Falle einer Verlegung der oberen Atemwege durch einen Fremdkörper zeigt die Blutgasanalyse typischerweise:</p> <p>a) Hypoxämie und Hyperkapnie b) Hypoxämie und Hypokapnie c) Hyperkapnie und Hyperoxie d) Hypokapnie</p>	29	<p>In caso di arresto cardiaco in assenza di rianimazione cardiopolmonare qual è la percentuale teorica di successo della defibrillazione dopo 5 minuti?</p> <p>a) circa 10% b) 20% - 30% c) circa 50% d) circa 70%</p>
30	<p>Frau L., 54 Jahre, wurde wegen eines Mammakarzinoms operiert. Sie hat eine Redon-Drainage in situ. Die Drainage fördert innerhalb von 6 Stunden 180 ml blutiges Sekret. Wie sollte die Pflegekraft in dieser Situation handeln?</p> <p>a) Drainage sofort entfernen b) Arzt informieren wegen erhöhter Fördermenge c) Drainage abklemmen d) Patientin mobilisieren, um den Abfluss zu fördern</p>	30	<p>Quale principio della collaborazione interprofessionale è evidenziato nel Codice Deontologico degli Infermieri?</p> <p>a) L'infermiere agisce indipendentemente da altri gruppi professionali per preservare la propria autonomia professionale b) La collaborazione interprofessionale serve principalmente a garantire il rispetto delle procedure amministrative del sistema sanitario c) L'infermiere condivide la responsabilità dell'assistenza integrata e rispetta le competenze degli altri d) Il coordinamento è richiesto solo in situazioni cliniche complesse</p>