

Busta n. 2

1. Quale tra le seguenti risposte sul glioblastoma multiforme non è corretta:

- a. È il tumore cerebrale maligno più comune negli adulti.
- b. Secondo la classificazione dell'OMS, esistono tre sottotipi istologici.
- c. Presenta molto spesso calcificazioni intralesionali.
- d. La rCBV è elevata rispetto ai tumori di basso grado.

2. Quale tra le seguenti risposte è corretta?

- a. La classificazione TI-RADS è utilizzata principalmente nella TC della tiroide.
- b. La classificazione TI-RADS è utilizzata principalmente nell'ecografia della tiroide.

3. Quale tra le seguenti risposte è corretta?

- a. L' "honeycombing" nei polmoni è un segno tipico della NSIP.
- b. L' "honeycombing" è classica nella fibrosi polmonare idiopatica (IPF).
- c. L' "honeycombing" è uno stadio tardivo della polmonite organizzativa.

4. La classificazione di Bismuth-Corlette si applica al:

- a. Colangiocarcinoma intraepatico perifocale
- b. Colangiocarcinoma perilare
- c. Colangiocarcinoma intraduttale distale

5. Quale delle seguenti risposte riguardanti l'endometriosi non è corretta:

- a. I noduli possono avere componenti fibroblastiche e metaplastiche e i noduli infiltranti profondi si presentano molto ipointensi in T2 con piccoli spot iperintensi in T1 SPIR.
- b. Quasi il 30-40% delle donne con infertilità primaria presenta endometriosi.
- c. L'esame RM non ha alcuna indicazione per l'endometriosi, neppure secondo le linee guida del 2022.

6. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?

- a. La classificazione ASAS serve con i propri criteri per classificare la sacroileite cronica
- b. La classificazione ASAS serve con i propri criteri per classificare la sacroileite acuta
- c. La classificazione ASAS in 20% dei casi è falsa positiva, soprattutto in donne giovani post partum e giovani sportivi

7. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- a. La scala di Biffi viene utilizzata per la gradazione delle lesioni cerebrali traumatiche
- b. Il rischio di stroke associato a lesione carotidea non aumenta con l'aumentare del grado della lesione
- c. Il rischio di stroke associato a lesione vertebrale aumenta con l'aumentare del grado della lesione
- d. Il grado V comprende la fistola arterovenosa

8. Nel trauma renale, qualsiasi lesione del sistema caliceale che provochi uno stravasamento di urina costituisce un trauma di quale grado secondo l'*American Association for the Surgery in Trauma (AAST)*?

- a. I
- b. II
- c. III
- d. IV
- e. V

9. Quale affermazione è corretta per la valutazione del rischio di embolia polmonare?

- a. La presenza di segni clinici di trombosi venosa profonda è un fattore di rischio.
- b. Un Wells-score superiore a 6 indica un gruppo ad alto rischio.
- c. Il D-dimero non viene mai testato nel gruppo a basso rischio in base al Wells-score.

10. Quale tra le seguenti risposte non è corretta?

- a. L'adenoma pleomorfo colpisce principalmente le ghiandole salivari.
- b. L'adenoma pleomorfo può verificarsi anche nella ghiandola lacrimale, nel condotto uditivo esterno e nella vulva.
- c. L'adenoma pleomorfo colpisce più frequentemente la ghiandola sottomandibolare.
- d. L'adenoma pleomorfo delle ghiandole salivari è più comune in soggetti di mezza età e leggermente più frequente nelle donne.