

Busta n. 3

1. Quale tra le seguenti risposte sul glioblastoma multiforme non è corretta:

- a. È il tumore cerebrale maligno più comune negli adulti.
- b. Secondo la classificazione dell'OMS, esistono tre sottotipi istologici.
- c. Presenta molto spesso calcificazioni intralesionali.
- d. La rCBV è elevata rispetto ai tumori di basso grado.

2. Quale tra le seguenti risposte è corretta:

- a. La metemoglobina è ipointensa in T1 e iperintensa in T2.
- b. La metemoglobina è iperintensa in T1 iperintensa in T2
- c. La metemoglobina è iperintensa in T1 e ipointensa in T2.

3. Quale tra le seguenti risposte è corretta?

- a. L' "honeycombing" nei polmoni è un segno tipico della NSIP.
- b. L' "honeycombing" è classica nella fibrosi polmonare idiopatica (IPF).
- c. L' "honeycombing" è uno stadio tardivo della polmonite organizzativa.

4. Secondo la Classificazione riveduta di Atlanta, solo uno di questi termini dovrebbe essere utilizzato per descrivere la pancreatite acuta:

- a. acute necrotic collection – raccolta necrotica acuta
- b. intrapancreatic pseudocyst – pseudocisti intrapancreatica
- c. necrotic pseudocyst – pseudocisti necrotica
- d. pancreatic abscess – ascesso pancreatico
- e. pancreatic phlegmon – flemmone pancreatico

5. Per la stadiazione del cancro del retto, quale tra le seguenti affermazioni è corretta:

- a. Nello stadio TNM T1, la muscolatura propria è invasa.
- b. Nello stadio TNM T3 il tumore invade da 1 a 5 mm oltre la muscolatura propria.
- c. Nello stadio T4 a, è invaso il peritoneo viscerale

6. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?

- a. La lesione SLAP II coinvolge l'ancora del bicipite.
- b. La lesione SLAP VII coinvolge l'ancora del bicipite e si estende al legamento gleno-omero mediale e alla capsula.
- c. Il grado di retrazione dei tendini della cuffia dei rotatori è descritto dalla classificazione di Goutallier.

7. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- a. La scala di Biffi viene utilizzata per la gradazione delle lesioni cerebrali traumatiche
- b. Il rischio di stroke associato a lesione carotidea non aumenta con l'aumentare del grado della lesione
- c. Il rischio di stroke associato a lesione vertebrale aumenta con l'aumentare del grado della lesione
- d. Il grado V comprende la fistola artero-venosa

8. Nel trauma renale, qualsiasi lesione del sistema caliceale che provochi uno stravaso di urina costituisce un trauma di quale grado secondo l'*American Association for the Surgery in Trauma (AAST)*?

- a. I
- b. II
- c. III
- d. IV
- e. V

9. Quale affermazione è corretta per la valutazione del rischio di embolia polmonare?

- a. La presenza di segni clinici di tromboembolia venosa profonda è un fattore di rischio.
- b. Un Wells-score superiore a 6 indica un gruppo ad alto rischio.
- c. Il D-dimero non viene mai testato nel gruppo a basso rischio in base al Wells-score.

10. Quale tra le seguenti risposte non è corretta?

- a. L'adenoma pleomorfo colpisce principalmente le ghiandole salivari.
- b. L'adenoma pleomorfo può verificarsi anche nella ghiandola lacrimale, nel condotto uditivo esterno e nella vulva.
- c. L'adenoma pleomorfo colpisce più frequentemente la ghiandola sottomandibolare.
- d. L'adenoma pleomorfo delle ghiandole salivari è più comune in soggetti di mezza età e leggermente più frequente nelle donne.