

Fragebogen B – Questionario B

1	<p><b>Welches ist der wichtigste Erreger der Mastitis im Wochenbett?</b></p> <p>a) Streptokokken der Gruppe A  b) Staphylococcus aureus  c) Streptokokkus viridans  d) Keine der obigen Antworten ist richtig</p>	1	<p><b>Qual è la causa più frequente della sindrome di Sheehan?</b></p> <p>a) shock emorragico  b) shock settico  c) sindrome hellp  d) nessuna delle precedenti</p>
2	<p><b>In den ersten beiden Tagen des Menstruationszyklus beträgt der Blutverlust:</b></p> <p>a) 50 % der Gesamtsumme  b) 70% der Gesamtsumme  c) 80 % der Gesamtsumme  d) nichts des oben Genannten</p>	2	<p><b>Il segno più precoce dell'occlusione intestinale neonatale è:</b></p> <p>a) il vomito  b) l'emissione di meconio verdastro  c) lo squilibrio idroelettrolitico  d) nessuna delle precedenti</p>
3	<p><b>Welches Hormon ist für die empfängnisverhütende Wirkung des Stillens verantwortlich?</b></p> <p>a) Östrogen  b) Prolaktin  c) Progesteron  d) Keines der genannten Hormone</p>	3	<p><b>Qual è lo scopo della somministrazione di corticosteroidi nelle gravide pretermine?</b></p> <p>a) Neuroprotezione fetale  b) Maturazione polmonare  c) Inibizione del travaglio  d) Evitare infezioni fetali</p>
4	<p><b>Das Immunglobulin mit der längsten Halbwertszeit ist:</b></p> <p>a) IgG  b) IgA  c) IgM  d) nichts des oben Genannten</p>	4	<p><b>Qual è il sintomo più frequente con cui si manifesta un carcinoma endometriale?</b></p> <p>a) dolore  b) emorragia  c) menometrorragia  d) nessuna delle precedenti</p>
5	<p><b>C-reaktives Protein wird zur Demonstration von folgenden Ereignissen verwendet:</b></p> <p>a) ansteckend  b) entzündlich  c) alle vorherigen  d) nichts des oben Genannten</p>	5	<p><b>Indicare il periodo entro il quale la fontanella anteriore si chiude:</b></p> <p>a) 1 anno di vita  b) 2 anni di vita  c) 3 anni di vita  d) nessuna delle precedenti</p>
6	<p><b>Welcher der folgenden Fälle ist keine absolute Indikation für eine Sectio?</b></p> <p>a) Schädel- Becken - Missverhältnis (geschätztes Gewicht 4.800 g)  b) z.n. Sectio  c) Grünes FW M3 in der Eröffnungsphase (HT-Veränderungen)  d) Keiner der oben genannten Punkte</p>	6	<p><b>Secondo l'algoritmo assistenziale, in caso di distocia di spalle, la manovra di Gaskin è indicata:</b></p> <p>a) nei casi di ridotta mobilità della paziente  b) è sempre consigliata  c) nei casi in cui la donna si trovi in posizioni alternative (accovacciata, sgabello, in piedi)  d) nessuna delle precedenti</p>
7	<p><b>Welcher der folgenden Punkte ist keine Indikation für B-Lynch?</b></p> <p>a) Koagulopathien  b) Plazenta percreta  c) Atonische Blutungen  d) keiner der oben genannten Punkte</p>	7	<p><b>L'apoplessia utero- placentare e` anche detta:</b></p> <p>a) sindrome di Couvelaire  b) utero di Bendle  c) utero patologico di Malmström  d) nessuna delle precedenti</p>

## Fragebogen B – Questionario B

8	<b>Wann wird ein AFI im oberen Normbereich festgestellt?</b> a) 5-25 cm b) 5-8 cm c) 22-25 cm d) >25 cm	8	<b>L'immunoglobulina dotata della emivita più lunga è:</b> a) IgG b) IgA c) IgM d) nessuna delle precedenti
9	<b>Geben Sie die Inkubationszeit von Röteln an:</b> a) 21 Tage b) 14-21 Tage c) 14 Tage d) nichts des oben Genannten	9	<b>Tra i seguenti marcatori tumorali, quale ha una maggiore specificità per le patologie mammarie?</b> a) PSA b) CEA c) CA 15-3 d) Nessuna delle precedenti
10	<b>Welchen Zweck hat die Verabreichung von Kortikosteroiden bei Frühgeburtsbestrebungen?</b> a) Fetale Neuroprotektion b) Lungenreifung c) Hemmung der Wehentätigkeit d) Vermeidung fetaler Infektionen	10	<b>Indicare tra le seguenti una manovra non utilizzabile nell'ambito dell'assistenza alla distocia di spalla:</b> a) manovra di Jacquemier b) manovra All Fours c) tutte le precedenti d) nessuna delle precedenti
11	<b>Innerhalb welcher Zeit sollte gemäß der RCOG-Leitlinie „Thromboembolische Erkrankungen in der Schwangerschaft und im Wochenbett: Akutmanagement“, die Heparintherapie vor einem geplanten Kaiserschnitt abgesetzt werden?</b> a) 48 Stunden b) 36 Stunden c) 24 Stunden d) 12 Stunden	11	<b>Un neonato è stato ventilato con pallone e maschera. I segni di una ventilazione efficace e adeguata sono:</b> a) Respiri spontanei, tono muscolare ridotto, colorito cutaneo pallido b) Diminuzione della frequenza cardiaca ed espansione bilaterale dei polmoni c) Respiri spontanei, ridotte secrezioni della bocca, tono muscolare assente d) Miglioramento della frequenza cardiaca ed espansione bilaterale dei polmoni
12	<b>Das Edward-Syndrom hängt mit der Trisomie welchen Chromosoms zusammen?</b> a) 18 b) 21 c) 13 d) nichts des oben Genannten	12	<b>secondo l'OMS, la fase attiva del primo stadio generalmente non supera, per le pluripare, le:</b> a) 8 ore b) 10 ore c) 12 ore d) 6 ore
13	<b>Das HIV-Screening während der Schwangerschaft sollte angeboten werden :</b> a) Jeden Monat b) nur im ersten Trimester c) Nur im dritten Trimester d) Im ersten und dritten Trimester	13	<b>Quale ormone e` dovuto l' effetto contraccettivo dell'allattamento?</b> a) Estrogeni b) Prolattina c) Progesterone d) Nessuna delle precedenti

## Fragebogen B – Questionario B

14	<p><b>Identifizieren Sie unter den folgenden Berufen, die Berufe, die nicht durch das Gesetz vom 10. August 2000, Nr. 251, geregelt sind:</b></p> <p>a) die Pflege- und Gesundheitsberufe und der Hebammen-Gesundheitsberuf  b) Rehabilitationsberufe im Gesundheitswesen  c) Berufe der Sozialen Arbeit  d) nichts des oben Genannten</p>	14	<p><b>Quale tra i seguenti non rientra nei parametri d'esclusione ostetrici materni intra partum per la donazione di sangue cordonale?</b></p> <p>a) Prom &gt; 12h  b) Gestosi gravidica grave  c) Febbre &gt;38°C nelle 24h precedenti al parto  d) Induzione</p>
15	<p><b>Die Maskenbeatmung mit dem Beatmungsbeutel wurde bei einem Neugeborenen nach der Geburt durchgeführt. Den Erfolg der Beatmung erkennt man an:</b></p> <p>a) Spontane Atemzüge, reduzierter Muskeltonus, Hautkolorit blass  b) Verminderte Herzfrequenz und entfaltete Lunge (beidseits)  c) Spontane Atemzüge, reduzierte Mundsekrete, kein Muskeltonus  d) Verbesserung der Herzfrequenz und gut entfaltete Lunge (belüftet)</p>	15	<p><b>Secondo la Linea guida RCOG „Malattia tromboembolica in gravidanza e puerperio: gestione acuta“ entro quanto tempo deve essere interrotta la terapia con eparina prima di un taglio cesareo programmato?</b></p> <p>a) 48 ore  b) 36 ore  c) 24 ore  d) 12 ore</p>
16	<p><b>Das früheste Anzeichen einer Darmobstruktion beim Neugeborenen ist:</b></p> <p>a) erbrechen  b) das Absetzen von grünlichem Mekonium  c) Flüssigkeit- Elektrolyt Ungleichgewicht  d) nichts des oben Genannten</p>	16	<p><b>La proteina C reattiva trova impiego per la dimostrazione di eventi:</b></p> <p>a) infettivi  b) infiammatori  c) tutte le precedenti  d) nessuna delle precedenti</p>
17	<p><b>Die Magill-Zange wird bei der Intubation eines Neugeborenen verwendet:</b></p> <p>a) um den Endotrachealtubus zwischen den Stimmbändern zu leiten  b) eine Rachenblutung zu stoppen  c) um die Mayo-Kanüle zu entfernen  d) nichts des oben Genannten</p>	17	<p><b>Quale delle seguenti non é una indicazione assoluta al TC?</b></p> <p>a) Sproporzione fetto-pelvica (peso stimato 4.800gr)  b) TC Progresso  c) Liquido amniotico tinto M3 nel primo stadio del travaglio (alterazioni BCF)  d) Nessuna delle precedenti</p>
18	<p><b>Geben Sie den Prozentsatz der Neugeborenen an, die bei der Geburt Unterstützung für den Beginn der unabhängigen Atmung benötigen:</b></p> <p>a) 20 %  b) 2 %  c) 10 %  d) nichts des oben Genannten</p>	18	<p><b>Nei primi due giorni del ciclo mestruale l'entità delle perdite ematiche ammonta a:</b></p> <p>a) nessuna delle Precedenti  b) 50% del totale  c) 70% del totale  d) 80% del totale</p>
19	<p><b>Geben Sie den Zeitraum an, innerhalb dessen sich die vordere Fontanelle schließt:</b></p> <p>a) 2 Jahre  b) 3 Jahre  c) 1 Jahr  d) nichts des oben Genannten</p>	19	<p><b>Secondo la classificazione Bethesda Sistem 2001, le lesioni preinvasive vengono classificate in:</b></p> <p>a) LSIL  b) HSIL  c) Nessuna delle precedenti  d) Tutte le precedenti</p>
20	<p><b>Welcher der folgenden Tumormarker weist eine höhere Spezifität für Brustkrankungen auf?</b></p> <p>a) CEA  b) CA 15-3  c) PSA  d) Keine der oben genannten Möglichkeiten</p>	20	<p><b>Quando si identifica un AFI ai limiti superiori della norma?</b></p> <p>a) 5-25 cm  b) 5-8 cm  c) 22-25 cm  d) &gt; 25 cm</p>

## Fragebogen B – Questionario B

21	<p><b>Nach der Klassifizierung des Bethesda-Systems von 2001 werden präinvasive Läsionen in folgende Kategorien eingeteilt:</b></p> <p>a) LSIL b) HSIL c) Alle der oben genannten Möglichkeiten d) Keine der oben genannten Möglichkeiten</p>	21	<p><b>Individuare, tra le seguenti, le professioni che non sono disciplinate dalla L. 10 agosto 2000, nr. 251:</b></p> <p>a) nessuna delle precedenti b) le professioni sanitarie infermieristiche e la professione sanitaria ostetrica c) le professioni sanitarie riabilitative d) le professioni per l'assistenza sociale</p>
22	<p><b>Welcher der folgenden Punkte ist eine Kontraindikation für eine Amniotomie?</b></p> <p>a) Plazenta praevia marginalis b) Wehenschwäche c) Vorliegen der Nabelschnur d) Keine der genannten Möglichkeiten</p>	22	<p><b>Quale delle seguenti non è un indicazione alla B-Lynch?</b></p> <p>a) Coagulopatie b) Placenta percreta c) Emorragie per atonie uterine d) Nessuna delle precedenti</p>
23	<p><b>Nach Angaben der WHO beträgt die aktive Eröffnungsphase bei Mehrgebärenden im Allgemeinen nicht mehr als:</b></p> <p>a) 10 Stunden b) 8 Stunden c) 12 Stunden d) 6 Stunden</p>	23	<p><b>Indicare la percentuale di neonati che necessitano, alla nascita, di forme di assistenza per l'inizio della respirazione autonoma:</b></p> <p>a) 20% b) 2% c) 10% d) nessuna delle precedenti</p>
24	<p><b>Welcher der folgenden Punkte fällt nicht unter die mütterlichen intrapartalen geburtshilflichen Ausschlusskriterien für die Nabelschnurblutspende?</b></p> <p>a) Prom &gt; 12h b) Schwere Präeklampsie c) Fieber &gt;38°C in den 24 Stunden vor der Entbindung d) Geburtseinleitung</p>	24	<p><b>La pinza di Magill, in caso di intubazione di un neonato, serve a:</b></p> <p>a) guidare il tubo endotracheale tra le corde vocali b) arrestare un'emorragia faringea c) rimuovere la cannula di Mayo d) nessuna delle precedenti</p>
25	<p><b>Was ist das häufigste Symptom von Endometriumcarcinom?</b></p> <p>a) Blutung b) Schmerzen c) Menometrorrhagien d) nichts des oben Genannten</p>	25	<p><b>Lo screening per l'HIV in gravidanza dovrebbe essere offerto:</b></p> <p>a) Ogni mese b) Solo in primo trimestre c) Solo nel terzo trimestre d) Nel primo e nel terzo trimestre</p>
26	<p><b>Was ist die häufigste Ursache des Sheehan-Syndroms?</b></p> <p>a) Hämorrhagischer Schock b) septischer Schock c) Hellp-Syndrom d) nichts des oben Genannten</p>	26	<p><b>Qual è il principale agente patogeno che causa mastite nel periodo puerperale?</b></p> <p>a) Streptococco gruppo A b) Stafilococco aureo c) Streptococco viridans d) Nessuna delle precedenti</p>
27	<p><b>Bereits bestehender Diabetes vor Schwangerschaft wird diagnostiziert, wenn:</b></p> <p>a) zwei Nüchtern-Plasmaglukosewerte <math>\geq 126</math> mg/dl b) zufällige Plasmaglukose <math>\geq 200</math> mg/dl c) alle vorherigen d) nichts des oben Genannten</p>	27	<p><b>Qual è, tra le seguenti, una controindicazione all'amnioressi?</b></p> <p>a) Placenta praevia marginale b) Inerzia uterina c) Nessuna delle precedenti d) Procidenza di funicolo</p>

## Fragebogen B – Questionario B

28	<p><b>Die „Apoplexia uteri“ wird auch bezeichnet als:</b></p> <p>a) Uterus von Bendle  b) Couvlaire -Syndrom  c) Pathologischer Uterus pato nach Malmström  d) keiner der oben genannten Fälle</p>	28	<p><b>Indicare il periodo di incubazione della rosolia:</b></p> <p>a) 21 giorni  b) 14 giorni  c) 14-21 giorni  d) nessuna delle precedenti</p>
29	<p><b>Geben Sie eines der folgenden Manöver an, die nicht als Teil der Schulterdystokie-Unterstützung verwendet werden können:</b></p> <p>a) Jacquemiers Manöver  b) All fours Manöver  c) alle oben Genannten  d) keine der oben Genannten</p>	29	<p><b>Si pone diagnosi di diabete pregravidico se:</b></p> <p>a) due valori di glicemia plasmatica a digiuno <math>\geq 126</math> mg/dl  b) glicemia plasmatica random <math>\geq 200</math> mg/dl  c) tutte le precedenti  d) nessuna delle precedenti</p>
30	<p><b>Nach dem Algorithmus ist bei Schulterdystokie das Gaskin-Manöver angezeigt:</b></p> <p>a) bei eingeschränkter Mobilität des Patienten  b) in Fällen, in denen sich die Frau in alternativen Positionen befindet (hockend, Hocker, stehend)  c) es wird immer empfohlen  d) keine der oben Genannten</p>	30	<p><b>La sindrome di Edward è legata alla trisomia di quale cromosoma?</b></p> <p>a) 18  b) 21  c) 13  d) nessuna delle precedenti</p>