

Fragebogen C – Questionario C

1	<p>Welches der folgenden Beschreibung ist ein Hinweis, dass die Anlegetechnik falsch ist:</p> <p>a) Das Neugeborene hat den größten Teil des Warzenhofes im Mund, Mund gefüllt vom Brustgewebe</p> <p>b) Das Neugeborene hat nur die Brustwarze im Mund</p> <p>c) Lippen sind nach außen gestülpt</p> <p>d) Das Kinn berührt die Brust</p>	1	<p>Qual è il ruolo del solfato di magnesio nelle donne con diagnosi di p-PROM?</p> <p>a) Ha funzione di neuroprotezione per il neonato</p> <p>b) Nessuno, non viene somministrato nelle donne con diagnosi di p-PROM</p> <p>c) Riduce la sindrome da distress respiratorio</p> <p>d) Previene attacco eclamptico</p>
2	<p>Ab welchem Monat ist die Haut des Fötus mit Vernix caseosa bedeckt?</p> <p>a) V Monat</p> <p>b) VI Monat</p> <p>c) VIII Monat</p> <p>d) nichts des oben Genannten</p>	2	<p>Qual è il trattamento standard delle pazienti con p-PROM?</p> <p>a) terapia con antidolorifici</p> <p>b) terapia con antibiotici</p> <p>c) terapia con antiemetici</p> <p>d) terapia con tocolitici</p>
3	<p>Gn-RH ist:</p> <p>a) ein Hormon hypophysären Ursprungs</p> <p>b) ein Hormon ovariellen Ursprungs</p> <p>c) ein Hormon hypothalamischer Herkunft</p> <p>d) nichts des oben Genannten</p>	3	<p>L'obliquità di Litzmann è detta anche:</p> <p>a) Asinclitismo anteriore</p> <p>b) Asinclitismo posteriore</p> <p>c) Asinclitismo</p> <p>d) Nessuna delle precedenti</p>
4	<p>Akuter oder chronischer Alkoholkonsum führt zu einem Anstieg welcher dieser Metaboliten?</p> <p>a) GT-Reihe</p> <p>b) Amylase</p> <p>c) Lipase</p> <p>d) nichts des oben Genannten</p>	4	<p>Attraverso quale delle seguenti manovre di Leopold si pone diagnosi di epoca di gravidanza?</p> <p>a) Quarta</p> <p>b) Terza</p> <p>c) Seconda</p> <p>d) Prima</p>
5	<p>Das Fibrinogen während der Schwangerschaft:</p> <p>a) nimmt ab</p> <p>b) erhöht sich</p> <p>c) bleibt stabil</p> <p>d) nichts des oben Genannten</p>	5	<p>Cosa significa la sigla SIDS?</p> <p>a) Systematic Infant Death Syndrome</p> <p>b) Sudden Infantility Death Syndrome</p> <p>c) Sudden Infant Death Syndrome</p> <p>d) nessuna delle precedenti</p>
6	<p>In welche Robson-Klasse fällt ein Kaiserschnitt, der vor der 37. Schwangerschaftswoche durchgeführt wird?</p> <p>a) V</p> <p>b) VI</p> <p>c) VII</p> <p>d) X</p>	6	<p>Quali sono i fattori che devono essere ridotti per ridurre il rischio di convulsioni durante il travaglio in una donna epilettica?</p> <p>a) insonnia, stress e disidratazione</p> <p>b) alimentazione</p> <p>c) l'epilessia è una controindicazione al parto vaginale</p> <p>d) uso dell'acqua</p>
7	<p>Der Office-Ultraschall ist ein Ultraschall von:</p> <p>a) I Level</p> <p>b) II level</p> <p>c) Dient als Unterstützung der geburtshilflichen Visite</p> <p>d) nichts des oben Genannten</p>	7	<p>A partire da quale mese la cute fetale si ricopre di vernice caseosa?</p> <p>a) V mese</p> <p>b) VI mese</p> <p>c) V III mese</p> <p>d) nessuna delle precedenti</p>
8	<p>Kopliks Flecken sind vorhanden:</p> <p>a) bei Windpocken</p> <p>b) bei Röteln</p> <p>c) bei Masern</p> <p>d) nichts des oben Genannten</p>	8	<p>Durante la gravidanza il fibrinogeno:</p> <p>a) diminuisce</p> <p>b) aumenta</p> <p>c) resta stabile</p> <p>d) nessuna delle precedenti</p>

Fragebogen C – Questionario C

9	<p>Welche Rolle spielt Magnesiumsulfat bei Frauen mit p-PROM Diagnose?</p> <p>a) Keine, es wird Frauen, bei denen eine p-PROM diagnostiziert wurde, nicht verabreicht</p> <p>b) Es hat eine neuroprotektive Funktion für das Neugeborene</p> <p>c) Es reduziert den respiratorischen Distress</p> <p>d) Es verhindert eklamptische Anfälle</p>	9	<p>Secondo la classificazione FIGO (Federazione Internazionale di Ginecologia e Ostetricia) un tumore cervicale di II stadio è un tumore che:</p> <p>a) Ha invaso la parte posteriore dell' utero ma non la pelvi</p> <p>b) È confinato alla cervice uterina</p> <p>c) È arrivato alla pelvi ad ha invaso anche i reni</p> <p>d) Nessuna delle precedenti</p>
10	<p>Welcher der folgenden Punkte ist keine Kontraindikation für einen Schwangerschaftsabbruch mit medikamentöser Methode?</p> <p>a) Schwere Anämie (hb < 9g)</p> <p>b) Gerinnungsstörungen (hämorrhagisch) oder laufende Antikoagulantia Therapie</p> <p>c) Vernarbung der Gebärmutter</p> <p>d) Bestätigte oder vermutete Eileiterschwangerschaft</p>	10	<p>L'unico intervento preventivo di provata efficacia per ridurre il rischio della Sudden Infant Death Syndrome è:</p> <p>a) posticipare al 6° mese la somministrazione delle vaccinazioni</p> <p>b) mettere il bambino in posizione supina per farlo dormire</p> <p>c) mettere il bambino in posizione prona per il sonno</p> <p>d) nessuna delle precedenti</p>
11	<p>Bei welchem der folgenden Punkte findet Methylergometrin keine Anwendung?</p> <p>a) Uteriner Hypotonus nach Plazentageburt</p> <p>b) Vorbeugung von Blutungen</p> <p>c) Hilfsmittel zur Ausstoßung der Plazenta</p> <p>d) Keiner der oben genannten Punkte</p>	11	<p>Quale tra i seguenti elementi è indice di attacco al seno scorretto:</p> <p>a) Il neonato ha in bocca gran parte dell'areola, la bocca è riempita dal seno</p> <p>b) Il neonato ha in bocca solo il capezzolo</p> <p>c) le labbra sono rovesciate in fuori</p> <p>d) il mento sfiora il seno</p>
12	<p>Das Prader-Willi-Syndrom wird durch das Chromosom verursacht:</p> <p>a) 13</p> <p>b) 21</p> <p>c) 15</p> <p>d) nichts des oben Genannten</p>	12	<p>Un taglio cesareo effettuato prima della 37a settimana di gestazione, in quale classe di Robson rientra?</p> <p>a) V</p> <p>b) VI</p> <p>c) VII</p> <p>d) X</p>
13	<p>Welcher der folgenden Leopold'schen Handgriffe wird zur Diagnose der Schwangerschaftswoche verwendet?</p> <p>a) Erster</p> <p>b) Zweiter</p> <p>c) Dritter</p> <p>d) Viertes</p>	13	<p>In base alla classificazione del peso alla nascita, i neonati definiti LBW hanno un peso compreso:</p> <p>a) tra 2550 e 4199</p> <p>b) tra 1500 e 2499</p> <p>c) tra 1000 e 1499</p> <p>d) nessuna delle precedenti</p>
14	<p>Welche der folgenden Lebensmittel sollten während der Schwangerschaft nicht verzehrt werden, um eine Überdosierung von Vitamin A zu vermeiden?</p> <p>a) Leber und aus der Leber hergestellte Lebensmittel</p> <p>b) reifer Käse</p> <p>c) Frischkäse</p> <p>d) Krebstiere</p>	14	<p>La sindrome di Prader-Willi è data dal cromosoma:</p> <p>a) 13</p> <p>b) 21</p> <p>c) 15</p> <p>d) nessuna delle precedenti</p>

Fragebogen C – Questionario C

15	<p>Mit welchen der folgenden Gesetze wurden Familienberatungsstellen eingerichtet?</p> <p>a) L. 29. Juli 1975, Nr. 405 b) L. 29. Februar 1975, Nr. 406 c) L. 29. August 1975, Nr. 405 d) nichts des oben Genannten</p>	15	<p>L'assunzione acuta o cronica di alcool induce l'aumento di quale di questi metaboliti?</p> <p>a) gamma-GT b) amilasi c) lipasi d) nessuna delle precedenti</p>
16	<p>Die erste wichtigste Maßnahme, bei einem Neugeborenen, welches nach der Geburt wiederbelebt werden muss, ist:</p> <p>a) Brustkompressionen starten b) Adrenalin verabreichen c) Die Lunge zu beatmen d) Die Verwendung des pädiatrischen Defibrillators</p>	16	<p>Quali dei seguenti alimenti è sconsigliato assumere in gravidanza per evitare sovradosaggi di vitamina A?</p> <p>a) fegato e alimenti prodotti a partire dal fegato b) formaggi stagionati c) formaggi freschi d) crostacei</p>
17	<p>Die Bewertung des Apgar-Scores misst nicht:</p> <p>a) Farbe b) Anstrengung der Atmung c) Körpertemperatur d) Herzfrequenz</p>	17	<p>L'Gn-RH è:</p> <p>a) un ormone di origine ipofisaria b) un ormone di origine ipotalamica c) un ormone di origine ovarica d) nessuna delle precedenti</p>
18	<p>Die einzige vorbeugende Intervention mit nachgewiesener Wirksamkeit zur Reduzierung des Risikos eines „Sudden Infant Death Syndrome“ ist:</p> <p>a) die Verabreichung der Impfungen auf den 6. Monat verschieben b) Rückenlage zum Schlafen c) Bauchlage zum Schlafen d) Nichts des oben Genannten</p>	18	<p>La prima azione, più importante ed efficace, per assistere un neonato che necessita di essere rianimato dopo il parto è:</p> <p>a) iniziare le compressioni toraciche b) somministrare adrenalina c) ventilare i polmoni d) usare il defibrillatore pediatrico</p>
19	<p>Bei einem Neugeborenen mit Atemnot wird Folgendes beobachtet:</p> <p>a) erhöhte Atemfrequenz und Brusteinbuchtungen b) Erbrechen und Stuhlunregelmäßigkeiten c) metabolische Azidose d) nichts des oben Genannten</p>	19	<p>Quale tra le seguenti non è una controindicazione all' IVG con metodo farmacologico?</p> <p>a) Anemia grave (Hb < 9g) b) Patologie della coagulazione (emorragiche) o terapia anticoagulante in atto c) Cicatrici uterine d) Gravidanza ectopica confermata o sospetta</p>
20	<p>Was bedeutet die Abkürzung SIDS?</p> <p>a) Systematic Infant Death Syndrome b) Sudden Infantlity Death Syndrome c) Sudden Infant Death Syndrome d) Nichts des oben Genannten</p>	20	<p>Le macchie di Koplik sono presenti:</p> <p>a) nella varicella b) nel morbillo c) nella rosolia d) nessuna delle precedenti</p>
21	<p>Basierend auf der Klassifizierung des Geburtsgewichts haben Neugeborene, die als LBW definiert werden, ein Gewicht zwischen:</p> <p>a) zwischen 2550 und 4199 b) zwischen 1500 und 2499 c) zwischen 1000 und 1499 d) nichts des oben Genannten</p>	21	<p>La proteinuria è definita significativa in caso di:</p> <p>a) valori 20,3 g in una raccolta urinaria completa delle 24h b) valori 20,4 g in una raccolta urinaria completa delle 24 h c) tutte le precedenti d) nessuna delle precedenti</p>

22	<p>Der Sentinel-Lymphknoten ist:</p> <p>a) derjenige, der im Falle einer Lymphadenektomie verschont wird</p> <p>b) derjenige, der am weitesten vom Tumor entfernt liegt</p> <p>c) der erste Lymphknoten innerhalb der axillären Lymphknotenkette, den die Lymphflüssigkeit aus dem vom Krebs befallenen Bereich erreicht</p> <p>d) keine der oben genannten Möglichkeiten</p>	22	<p>Secondo la Linea guida intra partum care del Nice per management attivo del III stadio si intende:</p> <p>a) La somministrazione di 20 UI di ossitocina intrafunicolare, il clampaggio del funicolo dopo il 5° minuto dalla nascita, la trazione controllata del funicolo a segni di presenza della placenta in vagina</p> <p>b) Nessuna delle altre alternative è corretta</p> <p>c) La somministrazione di 5 UI di ossitocina i.m., il clampaggio del funicolo prima dell' 1° minuto dalla nascita, la trazione controllata del funicolo alla comparsa di un sanguinamento dai genitali esterni</p> <p>d) La somministrazione di 10 UI di ossitocina i.m., il clampaggio del funicolo tra il 1° e il 5° minuto dalla nascita, la trazione controllata del funicolo a segni di avvenuto distacco della placenta</p>
23	<p>Nach der FIGO-Klassifikation (Federazione Internazionale di Ginecologia e Ostetricia) ist ein Zervix Tumor im Stadium II ein Tumor, der:</p> <p>a) den hinteren Teil des Uterus, aber nicht das Becken infiltriert hat</p> <p>b) auf die Zervix beschränkt ist</p> <p>c) das Becken und auch die Nieren hat</p> <p>d) keine der genannten Möglichkeiten</p>	23	<p>Qual è, tra le seguenti, la causa principale di emorragia post partum?</p> <p>a) ritenzione di tessuto amniocoriale</p> <p>b) anomalia della contrazione uterina</p> <p>c) anomalia della coagulazione</p> <p>d) nessuna delle precedenti</p>
24	<p>Die Litzmann'sche Obliquität wird auch genannt:</p> <p>a) Vorderer Asynklitismus</p> <p>b) Asynklitismus</p> <p>c) Hinterer Asynklitismus</p> <p>d) Keiner der obigen Begriffe</p>	24	<p>L'ecografia Office è una ecografia di:</p> <p>a) supporto alla visita ostetrica</p> <p>b) I livello</p> <p>c) Il livello</p> <p>d) nessuna delle precedenti</p>
25	<p>Bei der intermittierenden Auskultation der fetalen Herzfrequenz (FHF) während der Wehen wird vermutet, eine Abweichung/ Veränderung (Dezeleration oder Tachykardie) festgestellt zu haben. Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden?</p> <p>a) Anbieten einer kontinuierliche CTG Überwachung</p> <p>b) Das Muster in der Kartei aufzeichnen und mit intermittierender Auskultation fortfahren</p> <p>c) Auskultieren der FHF für die nächsten drei Wehen</p> <p>d) Keine der oben genannten Maßnahmen</p>	25	<p>Il linfonodo sentinella è:</p> <p>a) Il primo linfonodo di drenaggio della linfa peritumorale</p> <p>b) Quello che viene risparmiato in caso di linfadenectomia</p> <p>c) Quello che si trova più lontano dal tumore</p> <p>d) Nessuna delle precedenti</p>

Fragebogen C – Questionario C

26	<p>Gemäß der Nice-Leitlinie intrapartum care bedeutet aktives Management des III. Stadiums:</p> <p>a) Verabreichung von 20IE Oxytocin direkt in die Nabelschnur, Abklemmen der Nabelschnur nach der 5. Minute post partum, kontrollierter Zug der Nabelschnur bei Anzeichen für das Vorhandensein der Plazenta in der Scheide</p> <p>b) Keine der anderen Alternativen ist richtig</p> <p>c) Verabreichung von 5IE Oxytocin i.m., Abklemmen der Nabelschnur vor der 1. Minute post partum, kontrollierter Zug der Nabelschnur nach sichtbarer Blutung nach außen</p> <p>d) Verabreichung von 10IE Oxytocin i.m., Abklemmen der Nabelschnur zwischen der 1. und 5. Minute nach der Geburt, kontrollierter Zug an der Nabelschnur bei positiven Lösungszeichen</p>	26	<p>Se durante l'auscultazione ad intermittenza della frequenza cardiaca fetale (FCF) durante il travaglio si sospetta di rilevarne una modificazione (decelerazione o tachicardia), quali sono le azioni da intraprendere?</p> <p>a) Offrire un tracciato cardiocografico in continua</p> <p>b) Registrare il pattern in cartella e continuare con l'auscultazione ad intermittenza</p> <p>c) Auscultare la FCF per le tre contrazioni successive</p> <p>d) Nessuna delle precedenti</p>
27	<p>Proteinurie wird als signifikant definiert bei:</p> <p>a) Werte 20,3 g in einer vollständigen 24-Stunden-Harnsammlung</p> <p>b) Werte 20,4 g in einer vollständigen 24-Stunden-Harnsammlung</p> <p>c) alle vorherigen</p> <p>d) nichts des oben Genannten</p>	27	<p>In un neonato con distress respiratorio si osserva:</p> <p>a) vomito e irregolarità dell'alvo</p> <p>b) aumento della frequenza respiratoria e rientramenti toracici</p> <p>c) acidosi metabolica</p> <p>d) nessuna delle precedenti</p>
28	<p>Was ist die Standardbehandlung von Patienten mit p-PROM?</p> <p>a) Schmerztherapie</p> <p>b) Antibiotika Therapie</p> <p>c) antiemetische Therapie</p> <p>d) tokolytische Therapie</p>	28	<p>Con quali delle seguenti leggi sono stati istituiti i consultori familiari?</p> <p>a) L. 29 luglio 1975, n. 405</p> <p>b) L. 29 febbraio 1975, n. 406</p> <p>c) L. 29 agosto 1975, n. 405</p> <p>d) nessuna delle precedenti</p>
29	<p>Was ist die Hauptursache für postpartale Blutungen?</p> <p>a) Retention von Amniokorialgewebe</p> <p>b) Anomalie der Uteruskontraktion</p> <p>c) Gerinnungsanomalie</p> <p>d) keines der oben Genannten</p>	29	<p>Quale dei seguenti non è un uso della metilergometrina?</p> <p>a) Ipertono uterino post secondamento</p> <p>b) Prevenzione emorragie</p> <p>c) Coadiuvante nell'espulsione della placenta</p> <p>d) Nessuna delle precedenti</p>
30	<p>Welche Faktoren müssen reduziert werden, um das Risiko von Anfällen während der Wehen bei einer Frau mit Epilepsie zu verringern?</p> <p>a) Schlaflosigkeit, Stress und Dehydrierung</p> <p>b) Diät</p> <p>c) Epilepsie ist eine Kontraindikation für eine vaginale Geburt</p> <p>d) Verwendung von Wasser</p>	30	<p>La valutazione del punteggio di Apgar non misura:</p> <p>a) Il colorito</p> <p>b) Lo sforzo respiratorio</p> <p>c) La temperatura corporea</p> <p>d) Battito cardiaco</p>